



Bloed geven is een VERANTWOORDELIJKE DAAD

De medische vragenlijst die u bij elke donatie invult en de medische selectiefase maken het mogelijk om vast te stellen of u zich in een zogenaamde 'risicosituatie' bevindt, dit is om elk risico van overdracht van HIV / AIDS, hepatitis B- en C-virussen en de veroorzaker van syfilis te vermijden.

Bloedveiligheid hangt af van de naleving van alle voorzorgsmaatregelen en in het bijzonder de maatregelen die in deze brochure worden beschreven.

Elke bloeddonor moet zich bewust zijn van dit riskante gedrag en moet zich melden bij de arts als ze zich in een van deze situaties bevinden.

BLOED-DONATIE.be

RISICOVOL GEDRAG LIJST

i seksueel contact met condoms is onderworpen aan dezelfde uitsluitingen

U MOET 4 MAANDEN WACHTEN ALS:

- U heeft een tattoo laten zetten of wegnemen, een permanente make-up of een piercing gedaan.
- U heeft een endoscopisch onderzoek ondergaan
- U bent geopereerd, getransfuseerd (ontvangen van bloed) of getransplanteerd.
- U heeft acupunctuur ondergaan bij een niet-zorgverlener.
- U is van seksueel partner veranderd
- U heeft occasioneel seksueel contact gehad.
- U bent een man en je hebt seksueel contact gehad met een man
- U bent in nauw contact geweest met bloed (steek, beet)

U MOET 12 MAANDEN WACHTEN ALS:

- U heeft drugs gebruikt door te snuiven
- U heeft seksueel contact gehad in ruil voor geld, goederen of diensten of met een drugsgebruiker.
- U heeft in dezelfde periode een seksueel contact gehad met meerdere partners of hebt deelgenomen aan groepsseks.
- U heeft seksueel contact gehad met een persoon met syfilis, hepatitis C, HIV/AIDS of HTLV.
- U heeft seksueel contact gehad met een persoon met hepatitis B (u die niet gevaccineerd bent).
- U komt uit een regio die risico loopt op hiv/aids en bent minder dan 12 maanden terug in België.

Als uw huidige (of toevallige) seksuele partner wordt beïnvloed door een van de bovengenoemde gedragingen, wordt u ook 12 maanden buitenspel gezet

U ZULT ZEKER WORDEN UITGESLOTEN VAN HET DONEREN VAN BLOED ALS:

- U heeft drugs intramusculair of intraveneus gebruikt
- U heeft hepatitis B (behalve als u genezen bent) of als uw partner hepatitis B heeft en u niet bent gevaccineerd.
- U heeft syfilis, hepatitis C, HIV/AIDS of HTLV

Lijst van risicovol gedrag gedefinieerd in de wet van 05 juli 1994, gewijzigd bij de Bloed

BLOED-DONATIE

RISICO GEDRAG

AIDS INFO



WAT ELKE BLOEDDONOR ZOU MOETEN WETEN

WAT BEDOELEN WIJ MET RISICOVOL GEDRAG?

Wanneer een donor (of partner) een gedrag, activiteit of levensstijl heeft die hen het risico geeft een infectieziekte op te lopen.

BELANGRIJKE DOOR BLOED OVERGEDRAGEN INFECTIEUZE AGENTIA

HIV/AIDS, hepatitis B en C, het middel dat verantwoordelijk is voor syfilis.

Deze infectieuze agentia worden overgedragen:

- Door seksueel contact
- Door drugsgebruik

Maar ook:

- Van moeder op kind tijdens zwangerschap, bevalling of borstvoeding.
- Door naalden die niet voor eenmalig gebruik zijn.

HOE ZORGEN WIJ VOOR DE BEVEILIGING VAN DE TRANSFUSIE?

Wij **INFORMEREN DONOREN** over risicovol gedrag dat kan worden dat de bron van besmetting kan worden. De betrokken donoren worden dan uitgesloten van de bloeddonatie.

We **MOEDIGEN DONOREN** aan om oprecht medische vragen te beantwoorden voor elke donatie.

We **HERINNEREN DONOREN** eraan dat ze op elk moment bloedproducten van hun donatie kunnen laten verwijderen door ons op de hoogte te stellen van belangrijke informatie (INFO POST DONATIE)

En natuurlijk doen we screeningstests voor elke bloeddonatie.

AIDS

Deze ziekte wordt veroorzaakt door het HIV-virus en wordt gekenmerkt door een afname van de afweer tegen infecties. Ondanks zijn virulentie is dit virus erg fragiel, het weerstaat slechts een paar minuten in de open lucht. Er zijn drie fasen:

De zogenaamde stille periode: Het begint van bij de besmetting. De geïnfecteerde persoon heeft geen symptoom, hij is al besmettelijk, maar infectie is niet detecteerbaar door screening.

HIV-positief: Gemiddeld 22 dagen na HIV besmetting, wordt het virus detecteerbaar (PCR of NAT) en ongeveer 4 weken later zijn de tests serologisch (antilichamen) positief. Op dit punt is de patiënt 'hiv-positief', maar over het algemeen heeft geen ernstige symptomen. Hij is altijd besmettelijk.

AIDS: De immuunafweer van de patiënt is ernstig verzwakt en het ontwikkelt verschillende zogenaamde "opportunistische" ziekten. Het is bijzonder vervuilend.

HEPATITIS B

Deze virale leverinfectie kan worden overgedragen via bloed of lichaamsvloeistoffen. Het virus is pas na ongeveer 60 dagen detecteerbaar door laboratoriumtests. Hepatitis B kan spontaan genezen of evolueren naar cirrose of leverkanker.

Het kan worden voorkomen door een vaccin.

HEPATITIS C

Deze andere virale leverinfectie wordt voornamelijk overgedragen door drugsgebruik (intraveneus, intramusculair of snif), zelden via geslachtsgemeenschap of van moeder op kind tijdens zwangerschap of bevalling. Het virus is pas na ongeveer 60 dagen detecteerbaar door laboratoriumtests. Hepatitis C geneest zelden spontaan en evolueert naar een chronische vorm, cirrose of leverkanker. **Er is geen preventief vaccin.**

LA SYFILIS

Deze seksueel overdraagbare infectie wordt veroorzaakt door bacteriën. Een paar weken na besmetting kunnen huid- en slijmvliesletsels verschijnen. Deze laesies kunnen spontaan verdwijnen, maar de patiënt is contaminant vanaf het begin van de infectie tot enkele jaren, zelfs als er geen zichtbare laesies of symptomen zijn. De infectie is pas na ongeveer 3 weken detecteerbaar door laboratoriumtests. Genezing kan worden bereikt door penicilline injecties. **Er is geen preventief vaccin.**

VEELGESTELDE VRAGEN

"Kun je jezelf infecteren door je bloed te doneren?"

Nee

omdat het gebruikte materiaal steriel en voor eenmalig gebruik is.

"Kun je besmet raken door bloed te krijgen (transfusie)?"

De weinige gedetecteerde infecties zijn te wijten aan de transfusie van bloed van een geïnfecteerde donor die zich in de stille periode bevindt, voordat screeningstests het in het bloed kunnen detecteren. Voor HIV/AIDS is het huidige risico 1/1.500.000

ANDERE VRAGEN?

U kan contact opnemen met een van onze artsen:



0473/61.11.62

medische.info@bloeddonatie.be

Als u twijfelt of zich aanbiedt om zich te laten testen,

GEEF GEEN BLOED

Praat met de arts die U zal ontvangen, hij kan u in de strengste vertrouwelijkheid doorverwijzen naar een gespecialiseerd screeningscentrum.

BLOED-DONATIE.be

GEN-DOC-LI-01B / V4
Du 10/07/2023